

1 數學符號

以下是寫數學證明時常見的符號介紹：

- $A \in B$: A 是集合 B 裡面的元素。關於集合的介紹可以自行查資料。
- $A \notin B$: A 不是集合 B 裡面的元素。
- \exists : 存在一個。例： $\exists x \geq 3, x - 2 = 5$ 為「存在一個 x 大於等於 3，使得 $x - 2 = 5$ 」，在描述複雜度時，通常可以假設所有變數都是非負整數。
- \nexists : 不存在一個。
- \forall : 對於所有。例： $\forall x \in S, x \leq x^2 - 10$ 為「對於所有在集合 S 裡面的元素 x ，符合 $x \leq x^2 - 10$ 」。
- $A \implies B$: 若命題 A 為真，則命題 B 為真。
- $A \impliedby B$: 若命題 B 為真，則命題 A 為真。
- $A \iff B$: 命題 A 為真，若且唯若命題 B 為真，也就是說同時符合 $A \impliedby B$ 和 $A \implies B$ 。有關命題的介紹可以自行查資料。

作業的證明都可以使用以上的符號，用文字清楚描述亦可。

2 極限

極限的嚴謹定義和運算在大學的微積分會詳細說明，在複雜度的證明上不會用到太多，因此這裡就只簡單介紹極限的概念以及一些性質。概念上來說，一個函數在 x 趨近於 a 的極限為 L ，記做

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L$$

表示當 x 越來越接近 a (但不等於 a) 時， $f(x)$ 的值就會越來越靠近 L 。要特別注意的是， $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$ 和 $f(a)$ 是完全不同的東西，因為 $f(a)$ 可能不存在，也可能 $\lim_{x \rightarrow a} f(x) \neq f(a)$ ，或者有各種奇怪的情況 (到了大學微積分就會看到各式各樣莫名其妙的函數了)。舉例來說，可以構造一個函數

$$f(x) = \begin{cases} 1 & , \text{if } x = 1 \\ 0 & , \text{if } x \neq 1 \end{cases}$$

則

$$f(1) = 1, \lim_{x \rightarrow 1} f(x) = 0$$

以下是幾個極限的運算性值，當然這些性質實際上是要證明的，但還是老話一句，這些就留給大學的微積分課吧。

已知 $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L, \lim_{x \rightarrow a} g(x) = M, \lim_{x \rightarrow a} h(x) = \infty$ ，則

$$(1) \lim_{x \rightarrow a} (f(x) + g(x)) = L + M$$

$$(2) \lim_{x \rightarrow a} (f(x) \times g(x)) = L \times M$$

$$(3) \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{L}{M} \quad (M \neq 0)$$

$$(4) \lim_{x \rightarrow a} \frac{1}{h(x)} = 0$$

在複雜度的證明中，只會用到 $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x)$ 這種極限的形式，以下給出一些常用的等式

$$(1) \lim_{x \rightarrow \infty} k = k \quad (\text{常數})$$

$$(2) \lim_{x \rightarrow \infty} x = \infty \quad (\text{此時可以說極限不存在})$$

$$(3) \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{x} = 0$$

$$(4) \lim_{x \rightarrow \infty} k^x = \begin{cases} 0 & , \text{if } k < 1 \\ 1 & , \text{if } k = 1 \\ \infty & , \text{if } k > 1 \end{cases}$$

例題 1

請計算 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{n+1}$ 。

解答

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{n+1} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{1 + \frac{1}{n}} = \frac{\lim_{n \rightarrow \infty} 1}{\lim_{n \rightarrow \infty} (1 + \frac{1}{n})} = \frac{1}{1} = 1$$

3 複雜度

以下我們將更深入了解 Big-O 的定義，這部分也許有點難理解，可以跳過沒關係，只要知道可以用兩方程相除結果的極限值來描述複雜度（量級）的關係就好（**想忽略此段落的同學可以直接跳到例題 5**）。我們會用時間複雜度和空間複雜度的觀念講解 Big-O 的精神，但 Big-O 絕對不僅限於這兩者，而是可以拿來描述所有函數，所以請大家絕對不要有「Big-O 就是時間/空間複雜度」的錯誤觀念。

在演算法的分析中，我們往往希望知道一個演算法在最差的情況下會跑多久，或是當資料量增加時，演算法所需時間的成長幅度。此時可以經過計算得到一個運算次數對資料量大小的函數 $f(n)$ ，表示該算法的特性，然而這個函數可能長得很醜，運算過

程也大都很複雜，因此一般狀況下不會有人想做這種苦工。換個想法，如果我們不要求那麼精準的計算 $f(n)$ ，而是找到另外一個函數 $g(n)$ ，並滿足

$$\forall n > 0, f(n) \leq g(n)$$

則我們就可以知道「不論 $f(n)$ 多大，他最多就是和 $g(n)$ 一樣大」，或是「 $f(n)$ 的成長速度最快就是和 $g(n)$ 一樣快」。然而，實際上我們很難知道 $f(n)$ 所帶的常數倍數是多少，或者在不同的情況下， $f(n)$ 所帶的常數倍數也可能會變動。舉例來說，如果現在討論的是空間複雜度， $f(n)$ 表示一個演算法所需要的空間大小，則在不同單位下 (byte, KB, MB, ...)， $f(n)$ 就會被乘上不同的常數，這時如果 $g(n)$ 也要跟著變動就是一件很麻煩的事。因此，我們可以把一個常數加進不等式中，只要 $g(n)$ 乘上一個常數之後可以滿足不等式就好了，如此一來在不同單位下就可以使用相同的 $g(n)$ 了！更改後的式子如下

$$\exists k > 0, \forall n > 0, f(n) \leq k \cdot g(n)$$

另外，我們在意的是一個函數的「趨勢」，也就是當 n 越來越大時， $f(n)$ 的成長速度有多快。反過來說，我們其實不太在意 $f(n)$ 在 n 很小時的特性，因此可以再把不等式的條件放寬，只要在 n 超過一個門檻值 N 之後滿足不等式就好，也就是

$$\exists k > 0, \exists N, \forall n > N, f(n) \leq k \cdot g(n)$$

而這個就是 Big-O 的正式定義！

$$f(n) \in O(g(n)) \iff \exists k > 0, \exists N, \forall n > N, f(n) \leq k \cdot g(n)$$

大家可以發現 $O(g(n))$ 其實是一個函數的集合，包含所有滿足以上式子的函數，所以正確的寫法是 $f(n) \in O(g(n))$ 而不是 $f(n) = O(g(n))$ ，但現在似乎都可以混用了。

以下用一些例子讓大家更了解這個定義：

例題 2

請證明 $3n^2 \in O(n^2)$ 。

證明

取 $k = 3, N = 0$ ，則 $\forall n > 0, 3n^2 \leq 3 \cdot n^2$ 成立，得證。
(當然也可以取 $N = 1, N = 2, \dots$ ，或是取 $k = 4, k = 5, \dots$)

例題 3

請證明 $3n^2 \in O(n^3)$ 。

證明

取 $k = 1, N = 3$ ，則 $\forall n > 3, 3n^2 \leq 1 \cdot n^3$ 成立，得證。

例題 4

請證明 $3n^2 \notin O(n)$ 。

證明

不論 k 取多少，只要 $n > k$ ， $3n^2 \leq k \cdot n$ 就不會成立，因此 N 不存在，也就是 $3n^2 \notin O(n)$ ，得證。

以上可以發現，要說 $n^2 \in O(n^3)$ 是可以的，因為 n^3 的確是 n^2 的上界，只是他是個比較鬆的上界。另外， $O(n+1)$ ， $O(2n)$ 等等的寫法也都是可以的，只是一般來說都會寫成等價的 $O(n)$ 。那麼，影片中說的取極限又是怎麼一回事呢？其實只要改寫一下式子就可以了：

$$\begin{aligned} f(n) \in O(g(n)) &\iff \exists k > 0, \exists N, \forall n > N, f(n) \leq k \cdot g(n) \\ &\iff \exists k > 0, \exists N, \forall n > N, \frac{f(n)}{g(n)} \leq k \end{aligned}$$

我們不知道 N 是多少，但是一定是個常數，那麼把 n 趨近到無限大就一定會超過 N 了！於是就得到

$$f(n) \in O(g(n)) \iff \exists k > 0, \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{f(n)}{g(n)} \leq k$$

也就是說，只要 $\frac{f(n)}{g(n)}$ 的極限值不是無限大（例如是一個常數），則 $f(n) \in O(g(n))$ ，而這就是影片中講解的判斷方法了。

註：上面的敘述不完全正確，事實上應該是

$$f(n) \in O(g(n)) \iff \exists k > 0, \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{f(n)}{g(n)} \leq k$$

，原因是右邊的極限不一定存在，例如 $\frac{f(n)}{g(n)}$ 在一個區間 $[a, b]$ 之間擺動。但是在實際描述演算法複雜度時，這種情況幾乎不可能發生，所以在本次作業可以直接當成前面若且唯若的敘述正確。

例題 5

請證明或否證 $f(n) \in O(n^3) \iff f(n) \in O((n+1)^3)$ 。

證明

對於這類型的命題，我們只須依據定義證明 $A \implies B$ 與 $A \impliedby B$ 即可。

(1) 先證明 $f(n) \in O(n^3) \implies f(n) \in O((n+1)^3)$:

$$\because f(n) \in O(n^3)$$

$$\therefore \exists k \geq 0, \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{f(n)}{n^3} = k$$

$$\begin{aligned} \therefore \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{f(n)}{(n+1)^3} &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{f(n)}{n^3} \cdot \frac{n^3}{(n+1)^3} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{f(n)}{n^3} \cdot \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^3}{(n+1)^3} \\ &= k \cdot 1 = k \quad (\text{仍然為一常數}) \end{aligned}$$

$$\therefore f(n) \in O((n+1)^3)$$

(2) 接著證明 $f(n) \in O(n^3) \iff f(n) \in O((n+1)^3)$:

$$\because f(n) \in O((n+1)^3)$$

$$\therefore \exists k \geq 0, \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{f(n)}{(n+1)^3} = k$$

$$\begin{aligned} \therefore \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{f(n)}{n^3} &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{f(n)}{(n+1)^3} \cdot \frac{(n+1)^3}{n^3} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{f(n)}{(n+1)^3} \cdot \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n+1)^3}{n^3} \\ &= k \cdot 1 = k \quad (\text{仍然為一常數}) \end{aligned}$$

$$\therefore f(n) \in O(n^3)$$

由 (1),(2), 得證 $f(n) \in O(n^3) \iff f(n) \in O((n+1)^3)$ 。

例題 6

請證明或否證 $f(n) \in O(2^n) \iff f(n) \in O(3^n)$ 。

證明

如果我們直接拿上一個例題的方式來解這個問題，會發現證明途中遇到阻礙， $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3^n}{2^n}$ 並不會收斂成一個常數。此時我們可以猜想，這個命題是錯誤的，我們所須要的僅僅是一個反例，再用反證法來證明否證原命題。

假設命題成立，那麼我們令 $f(n) = 3^n$ ，則

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{f(n)}{2^n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3^n}{2^n} = \infty$$

並非收斂為一個常數，矛盾。於是 $f(n) \in O(2^n) \iff f(n) \in O(3^n)$ 不成立，從而原命題不成立。

習題

1. 請回答以下問題：

(a) (10 pts) 請計算 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3n+1}{n-1}$

(b) (10 pts) 請計算 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{n^2+1}$

(c) (20 pts) 請證明或否證 $f(n) \in O(2^n) \iff f(n) \in O(2^{n+1})$

(d) (20 pts) 請證明或否證 $f(n) \in O(n!) \iff f(n) \in O((n+1)!)$

(e) (20 pts) 請證明或否證 $f(n) \in O(n) \implies 2^{f(n)} \in O(2^n)$

2. (20 pts) 已知一遞迴函數

$$f(n) = \begin{cases} 1 & , n = 1 \\ 2f(\lfloor \frac{n}{2} \rfloor) + 2n & , n > 1 \end{cases}$$

證明對所有滿足 $n = 2^m$ ，其中 m 為正整數的 n ， $f(n) \leq 3n \log_2 n$ 。

3. (20 pts) 已知一遞迴函數

$$f(n) = \begin{cases} 1 & , n = 1 \\ f(\lfloor \frac{n}{2} \rfloor) + f(\lceil \frac{n}{2} \rceil) + n^2 & , n > 1 \end{cases}$$

證明對所有正整數 n ， $f(n) \leq 2n^2 - 1$ 。(此時代表 $f(n) \in O(n^2)$)